

# Wasserpflanzen

2025



| Gattung, Art, Sorte                                | einheimisch = CH | Blütenfarbe          | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort   | WS cm      | Preis<br>SFr. |
|--|------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Acorus calamus                                     | CH               | braun, Blatt grün    | Juni–Juli   | 90            | S, HS      | 0–20       | 9.90          |
| Acorus calamus 'Variegatus'                        |                  | braun, Bl. weissbunt | Juni–Juli   | 70            | S, HS      | 0–20       | 9.90          |
| Alisma plantago-aquatica                           | CH               | weiss–zartrosa       | Juni–Aug.   | 70            | S, HS      | 0–20       | 9.90          |
| Aponogeton distachyos                              |                  | weiss                | Juli–Okt.   | 15            | S          | 20–50      | 24.50         |
| Arundo donax                                       |                  |                      |             | 350           | S          | feucht     | 24.50         |
| Arundo donax 'Peppermint Stick'                    |                  | Laub panaschiert     |             | 300           | S          | feucht     | 24.50         |
| Bolboschoenus maritimus (Scirpus m.)               | CH               |                      |             | 100           | S, HS      | 0–30       | 7.30          |
| Butomus umbellatus                                 | CH               | rosa                 | Juni–Aug.   | 90            | S, HS      | 10–30      | 9.90          |
| Calla palustris                                    | CH               | weiss                | Juni–Juli   | 20            | S, HS      | 0–20       | 9.90          |
| Callitriche palustris                              |                  | weiss                | Schwimmb.   |               | S, HS      | 10–80      | 9.90          |
| Caltha palustris                                   | CH               | gelb                 | März–Mai    | 40            | S, HS      | 0–10       | 7.30          |
| Caltha palustris 'Plena' (Caltha pal. 'Multiplex') |                  | gelb gefüllt         | März–Mai    | 20            | S, HS      | 0–10       | 9.90          |
| Caltha palustris var. alba                         |                  | weiss                | März–Mai    | 20            | S, HS      | 0–5        | 9.90          |
| Carex acuta (Carex gracilis)                       | CH               |                      |             | 60            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex acutiformis                                  | CH               |                      |             | 70            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex flacca (Carex glauca)                        | CH               |                      |             | 70            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex flava  | CH               |                      |             | 40            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex grayi  |                  |                      |             | 80            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex muskingumensis                               |                  |                      |             | 80            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex pendula                                      | CH               |                      |             | 100           | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Carex pseudocyperus                                | CH               |                      |             | 80            | S, HS, Sch | 0–1        | 6.20          |
| Ceratophyllum demersum                             | CH               | Unterwasserpfl.      |             |               | S, HS, Sch | 30–100     | 7.30          |
| Chara vulgaris                                     | CH               | Unterwasserpfl.      |             |               | S, HS      | 20–70      | 9.90          |
| Cladium mariscus                                   | CH               |                      |             | 150           | S, HS      | 0–30       | 7.30          |
| Comarum palustre <i>siehe Potentilla palustris</i> | CH               |                      |             |               |            |            |               |
| Cyperus longus                                     | CH               | rotbraun             | Juli–Aug.   | 100           | S, HS      | 0–20       | 9.90          |
| Darmera peltata                                    |                  | zartrosa             | April–Mai   | 80            | HS         | feucht     | 9.90          |
| Eichhornia crassipes                               |                  | hellviolett          | Juni–Sept.  | 15            | S          | schwimmend | 12.40         |
| Eleocharis acicularis                              | CH               |                      |             | 20            | S, HS      | 10–40      | 9.90          |
| Eleocharis palustris                               | CH               |                      |             | 30            | S, HS      | 10–60      | 9.90          |
| Equisetum hyemale var. robustum                    |                  | wintergrün           |             | 120           | S, HS, Sch | 0–40       | 9.90          |
| Equisetum scirpoides                               |                  |                      |             | 20            | S, HS, Sch | 0–5        | 9.90          |
| Eriophorum angustifolium                           | CH               | weiss                | April–Juni  | 40            | S, HS      | 0–5        | 9.90          |
| Eriophorum latifolium                              | CH               | weiss                | April–Juni  | 40            | S, HS      | 0–5        | 9.90          |
| Eriophorum vaginatum                               | CH               | weiss                | April–Juni  | 40            | S, HS      | 0–5        | 9.90          |
| Eupatorium cannabinum                              | CH               | hellrosa             | Juni–Sept.  | 130           | S, HS      | 0–5        | 9.90          |
| Eupatorium maculatum                               |                  | purpur               | Juli–Sept.  | 200           | S, HS      | feucht     | 9.90          |
| Eupatorium maculatum 'Atropurpureum'               |                  | weinrot              | Juli–Sept.  | 200           | S, HS      | feucht     | 9.90          |
| Euphorbia palustris                                | CH               | gelb                 | Mai–Juli    | 80            | S          | 0–10       | 9.90          |
| Filipendula rubra 'Venusta'                        |                  | dunkelrosa           | Juni–Juli   | 100           | S, HS      | feucht     | 8.30          |
| Filipendula ulmaria                                | CH               | weiss                | Juni–Aug.   | 100           | S, HS      | feucht     | 8.30          |
| Filipendula ulmaria 'Plena'                        |                  | weiss gefüllt        | Juni–Aug.   | 100           | S, HS      | feucht     | 8.30          |
| Fritillaria meleagris                              | CH               | purpur–rosa          | April–Mai   | 30            | S, HS      | feucht     | 7.30          |
| Gentiana asclepiadea                               | CH               | blau                 | Aug.–Sept.  | 60            | S, HS      | feucht     | 12.40         |
| Geranium palustre                                  | CH               | rot                  | Juni–Sept.  | 50            | S, HS      | feucht     | 6.20          |

| Gattung, Art, Sorte                                   | einheimisch = CH | Blütenfarbe       | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort   | WS cm      | Preis<br>SFr. |
|---|------------------|-------------------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| Geum rivale   | CH               | rotbraun          | Mai–Juni    | 40            | S, HS      | 0–5        | 6.20          |
| Gladiolus palustris                                   | CH               | rot               | Mai–Juni    | 40            | S          | feucht     | 8.30          |
| Glyceria maxima                                       | CH               |                   |             | 100           | S, HS      | 0–5        | 8.30          |
| Glyceria maxima 'Variegata'                           |                  |                   |             | 100           | S, HS      | 0–5        | 8.30          |
| Gratiola officinalis                                  | CH               | blassrosa         | Juni–Juli   | 30            | S          | 0–2        | 9.90          |
| Groenlandia densa (Potamogeton densus)                |                  | Unterwasserpfl.   |             |               | S, HS      | 10–30      | 9.90          |
| Gunnera tinctoria                                     |                  |                   |             | 200           | S, HS      | 0–5        | a.Anfrage     |
| Hippuris vulgaris                                     | CH               |                   |             | 30            | S, HS      | 10–80      | 9.90          |
| Hottonia palustris                                    | CH               | Unterwasserpfl.   |             |               | S, HS, Sch | 20–60      | 9.90          |
| Houttuynia cordata 'Chamäleon' (H. c. 'Variegata')    |                  | weiss, Laub bunt  | Juni–Sept.  | 30            | S, HS      | 0–10       | 9.90          |
| Hydrocharis morsus-ranae                              | CH               | weiss             | Juni–Aug.   | 10            | S, HS      | schwimmend | 9.90          |
| Iris ensata (Iris kaempferi)                          |                  | gemischt          | Juni–Aug.   | 80            | S          | 0–5        | 8.30          |
| Iris ensata 'Aka Fur' (I. kaempferi 'A. Fur')         |                  | blau              | Juni–Aug.   | 80            | S          | 0–5        | 8.30          |
| Iris ensata 'Royal Banner' (I. kaempferi 'R. Banner') |                  | purpurrot         | Juni–Aug.   | 80            | S          | 0–5        | 8.30          |
| Iris ensata 'White Lady' (I. kaempferi 'W. L.')       |                  | weiss             | Juni–Aug.   | 90            | S          | 0–5        | 8.30          |
| Iris laevigata  |                  | blau              | Juli–Aug.   | 80            | S          | 0–3        | 8.30          |
| Iris pseudacorus                                      | CH               | gelb              | Mai–Juni    | 80            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris sibirica   | CH               | blau              | Mai–Juni    | 80            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris sibirica 'Caesar's Brother'                      |                  | violett           | Mai–Juni    | 80            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris sibirica 'Emperor'                               |                  | blau              | Mai–Juni    | 80            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris sibirica 'Hubbard'                               |                  | rot               | Mai–Juni    | 70            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris sibirica 'Perry's Blue'                          |                  | himmelblau        | Mai–Juni    | 80            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris sibirica 'Snow Queen'                            |                  | weiss             | Mai–Juni    | 80            | S, HS      | 0–20       | 8.30          |
| Iris versicolor                                       |                  | violett           | Juni        | 80            | S          | 0–5        | 8.30          |
| Juncus effusus  | CH               |                   |             | 60            | S, HS      | 0–10       | 9.90          |
| Juncus effusus 'Spiralis'                             |                  |                   |             | 40            | S, HS      | 0–2        | 9.90          |
| Juncus ensifolius                                     |                  |                   |             | 30            | S, HS      | feucht     | 7.30          |
| Juncus inflexus (Juncus glaucus)                      | CH               |                   |             | 60            | S, HS      | 0–5        | 7.30          |
| Ligularia <i>siehe Blütenstauden</i>                  |                  |                   |             |               |            |            |               |
| Lychnis flos-cuculi                                   | CH               | rosa              | Mai–Juni    | 40            | S          | feucht     | 7.30          |
| Lysichiton americanus                                 |                  | gelb              | April–Mai   | 50            | HS         | 0–3        | 12.40         |
| Lysichiton camtschatcensis                            |                  | weiss             | April–Mai   | 50            | HS         | 0–3        | 12.40         |
| Lysimachia nummularia                                 | CH               | gelb              | Mai–Juli    | 5             | S, HS      | 0–5        | 6.20          |
| Lysimachia thyrsoiflora                               | CH               | gelb              | Mai–Juli    | 50            | S, HS      | 0–10       | 9.90          |
| Lysimachia vulgaris                                   | CH               | gelb              | Juni–Aug.   | 90            | S, HS      | 0–10       | 9.90          |
| Lythrum salicaria                                     | CH               | hellrot           | Juli–Sept.  | 80            | S, HS      | 0–1        | 7.30          |
| Mentha aquatica                                       | CH               | violett           | Juli–Sept.  | 50            | S, HS      | 0–10       | 7.30          |
| Mentha pulegium                                       | CH               | violettrosa       | Juli–Sept.  | 40            | S, HS      | 0–10       | 7.30          |
| Menyanthes trifoliata                                 | CH               | rötlichweiss      | Mai–Juni    | 30            | S, HS      | 0–10       | 9.90          |
| Mimulus guttatus                                      |                  | gelb,rote Flecken | Juni–Sept.  | 20            | S, HS      | 0–5        | 7.30          |
| Mimulus luteus  |                  | gelb              | Juni–Sept.  | 20            | S, HS      | 0–5        | 7.30          |
| Mimulus ringens                                       |                  | blauviolett       | Juli–Sept.  | 60            | S, HS      | 0–5        | 7.30          |
| Myosotis palustris                                    | CH               | blau              | Mai–Sept.   | 20            | S, HS      | 0–10       | 7.30          |
| Myriophyllum spicatum                                 | CH               | Unterwasserpfl.   |             |               | S, HS      | 30–100     | 7.30          |
| Nasturtium officinale                                 | CH               | weiss             | Juni–Aug.   | 30            | S, HS, Sch | 5–30       | 9.90          |

| Gattung, Art, Sorte                                   | einheimisch = CH | Blütenfarbe        | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | WS cm      | Preis<br>SFr. |
|---|------------------|--------------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Nelumbo lutea   |                  | gelb               | Juli–Sept.  | 50            | S        | 30–60      | 78.00         |
| Nelumbo nucifera                                      |                  | rosa               | Juli–Sept.  | 50            | S        | 30–60      | 78.00         |
| Nuphar lutea  | CH               | gelb               | Juni–Juli   |               | S, HS    | 50–200     | 56.00         |
| Nuphar pumila   |                  | gelb               | Juni–Aug.   |               | S, HS    | 20–80      | 56.00         |
| Nymphaea alba   | CH               | weiss              | Mai–Okt.    |               | S        | 60–180     | 56.00         |
| Nymphaea 'Berthold'                                   |                  | rosa               | Mai–Okt.    |               | S        | 20–30      | 56.00         |
| Nymphaea 'Black Princess'                             |                  | dunkelrot          | Mai–Okt.    |               | S        | 30–80      | 66.00         |
| Nymphaea 'Escarboucle'                                |                  | rot                | Mai–Okt.    |               | S        | 40–80      | 56.00         |
| Nymphaea 'Froebeli'                                   |                  | rot                | Mai–Okt.    |               | S        | 20–40      | 56.00         |
| Nymphaea 'James Brydon'                               |                  | rot                | Mai–Okt.    |               | S        | 30–60      | 56.00         |
| Nymphaea 'Joey Tomocick'                              |                  | dunkelgelb         | Mai–Aug.    |               | S        | 40–70      | 56.00         |
| Nymphaea 'Laydekeri Lilacea'                          |                  | lila               | Mai–Okt.    |               | S        | 20–40      | 56.00         |
| Nymphaea 'Marliacea Albida'                           |                  | weiss              | Mai–Okt.    |               | S        | 40–80      | 56.00         |
| Nymphaea 'Marliacea Chromatella'                      |                  | gelb               | Mai–Okt.    |               | S        | 50–80      | 56.00         |
| Nymphaea 'Moorei'                                     |                  | gelb               | Mai–Okt.    |               | S        | 50–80      | 56.00         |
| Nymphaea odorata 'Sulphurea'                          |                  | gelb               | Mai–Okt.    |               | S        | 30–40      | 56.00         |
| Nymphaea 'Perry's Baby Red'                           |                  | rot                | Mai–Okt.    |               | S        | 20–40      | 56.00         |
| Nymphaea 'Pygmaea Alba'                               |                  | weiss              | Mai–Okt.    |               | S        | 10–20      | 56.00         |
| Nymphaea 'Pygmaea Helvola'                            |                  | gelb               | Mai–Okt.    |               | S        | 10–20      | 56.00         |
| Nymphaea 'Pygmaea Rubra'                              |                  | rot                | Mai–Okt.    |               | S        | 10–20      | 56.00         |
| Nymphaea 'Pygmaea Walter Pagels'                      |                  | weiss              | Mai–Okt.    |               | S        | 10–20      | 56.00         |
| Nymphaea 'Rosennymphe'                                |                  | rosa               | Mai–Okt.    |               | S        | 40–70      | 56.00         |
| Nymphaea 'Sioux'                                      |                  | kupfer             | Mai–Okt.    |               | S        | 30–50      | 56.00         |
| Nymphoides peltata                                    | CH               | gelb               | Juni–Aug.   |               | S, HS    | 10–50      | 9.90          |
| Onoclea sensibilis                                    |                  |                    |             | 40            | HS, Sch  | feucht     | 8.30          |
| Orontium aquaticum                                    |                  | gelb               | Mai–Juni    | 30            | S        | 0–30       | 12.40         |
| Osmunda cinnamomea                                    |                  |                    |             | 100           | HS, Sch  | feucht     | 12.40         |
| Osmunda claytoniana                                   |                  |                    |             | 100           | HS, Sch  | feucht     | 12.40         |
| Osmunda regalis                                       | CH               |                    |             | 120           | HS, Sch  | feucht     | 12.40         |
| Persicaria amphibia (Polygonum amphibium)             | CH               | rosa               | Juni–Aug.   | 40            | S, HS    | 0–30       | 9.90          |
| Phragmites australis (Phragmites communis)            | CH               |                    |             | 300           | S, HS    | 0–70       | 9.90          |
| Phragmites australis ssp. picta                       |                  | Blatt gelbbunt     |             | 150           | S, HS    | 0–50       | 12.40         |
| Pistia stratiotes                                     |                  | unscheinbar        |             | 15            | S        | schwimmend | 12.40         |
| Polygonum amphibium <i>siehe Persicaria</i>           |                  |                    |             |               |          |            |               |
| Pontederia cordata                                    |                  | blau               | Juni–Juli   | 80            | S        | 0–20       | 12.40         |
| Potamogeton densus ( <i>siehe Groenlandia densa</i> ) |                  |                    |             |               |          |            |               |
| Potamogeton lucens                                    | CH               | Unterwasserpfl.    |             |               | S, HS    | 40–300     | 9.90          |
| Potamogeton natans                                    | CH               |                    | Schwimmb.   |               | S, HS    | 10–50      | 9.90          |
| Potentilla palustris (Comarum palustre)               | CH               | rot                | Juni–Juli   | 40            | S, HS    | 0–10       | 9.90          |
| Primula beesiana                                      |                  | purpurrot          | Juni–Juli   | 50            | HS       | feucht     | 6.20          |
| Primula bullesiana (×)                                |                  | gelb, rot, violett | Juni–Juli   | 50            | HS       | feucht     | 6.20          |
| Primula bulleyana                                     |                  | orange             | Juni–Juli   | 50            | HS       | feucht     | 6.20          |
| Primula florindae                                     |                  | gelb               | Juni–Aug.   | 60            | HS       | feucht     | 6.20          |
| Primula japonica 'Millers Crimson'                    |                  | rot                | Mai–Juli    | 60            | HS       | feucht     | 6.20          |
| Primula rosea 'Grandiflora'                           |                  | dunkelrosa         | März–April  | 20            | HS       | 0–5        | 6.20          |



| Gattung, Art, Sorte                                     | einheimisch = CH | Blütenfarbe          | Blütenmonat | Höhe<br>in cm | Standort | WS cm      | Preis<br>SFr. |
|---|------------------|----------------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Pteridium aquilinum                                     | CH               |                      |             | 180           | HS, Sch  | feucht     | 9.90          |
| Ranunculus aquatilis                                    | CH               | weiss                | Schwimtbl.  |               | S, HS    | 30–100     | 9.90          |
| Ranunculus flammula                                     | CH               | gelb                 | Juli–Okt.   | 30            | S        | 0–5        | 9.90          |
| Ranunculus lingua                                       | CH               | gelb                 | Juni–Sept.  | 100           | S, HS    | 0–30       | 9.90          |
| Sagittaria sagittifolia                                 | CH               | weiss                | Juni–Aug.   | 60            | S        | 0–20       | 9.90          |
| Schoenoplectus lacustris (Scirpus lacustris)            | CH               | braun                | Juni–Sept.  | 150           | S, HS    | 0–70       | 9.90          |
| Schoenoplectus lacustris 'Albescens' (Scirpus 'A.')     |                  | Blatt längsgestreift | Juni–Sept.  | 100           | S, HS    | 0–40       | 9.90          |
| Schoenoplectus tabernaemontani 'Zebrinus'               |                  | Blatt quergestreift  | Juni–Sept.  | 80            | S, HS    | 0–20       | 9.90          |
| Scirpus lacustris <i>siehe Schoenoplectus lacustris</i> |                  |                      |             |               |          |            |               |
| Scirpus tabernaemontani <i>siehe Schoenoplectus t.</i>  |                  |                      |             |               |          |            |               |
| Sparganium erectum                                      | CH               | grünlich             | Juni–Juli   | 60            | S, HS    | 0–30       | 9.90          |
| Stachys palustris                                       | CH               | purpurrosa           | Juni–Sept.  | 80            | S, HS    | 0–5        | 9.90          |
| Stratiotes aloides                                      | CH               | weiss                | Mai–Juni    |               | S, HS    | schwimmend | 15.00         |
| Symphytum officinale                                    | CH               | violett              | Mai–Juli    | 70            | HS, Sch  | feucht     | 7.30          |
| Thelypteris palustris                                   | CH               |                      |             | 50            | HS       | 0–2        | 9.90          |
| Trapa natans  | CH               | weiss                | Juni–Aug.   |               | S        | schwimmend | 21.00         |
| Trollius <i>siehe Blütenstauden</i>                     |                  |                      |             |               |          |            |               |
| Typha angustifolia                                      | CH               | braun                | Juli–Aug.   | 200           | S        | 0–50       | 9.90          |
| Typha latifolia   | CH               | braun                | Juli–Aug.   | 150           | S        | 0–50       | 9.90          |
| Typha laxmannii   | CH               | braun                | Juli–Aug.   | 100           | S        | 0–40       | 9.90          |
| Typha minima  | CH               | braun                | Juni–Juli   | 40            | S        | 0–20       | 9.90          |
| Typha shuttleworthii                                    |                  | braun                | Juli–Aug.   | 150           | S        | 0–40       | 9.90          |
| Utricularia vulgaris                                    | CH               | gelb                 | Juni–Aug.   | Unterw.pfl.   | S, HS    | 5–30       | 7.30          |
| Veronica beccabunga                                     | CH               | blau                 | Mai–Aug.    | 30            | S, HS    | 0–10       | 7.30          |